



اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) مقابل اختبار المستضد المنزلي السريع

دليل إرشادي

عندما ترتفع حالات COVID-19، يكون أي اختبار أفضل من لا شيء. إذا كانت لديك خيارات، فاتبع التوصيات الواردة في هذه الأمثلة.

الذهاب إلى حدث داخلي أو مزدحم؟

من الأفضل إجراء اختبار منزلي سريع في نفس اليوم (قبل الحدث).



هل أنت على اتصال وثيق بشخصٍ مُصاب بمرض COVID-19 ولكن لا تظهر عليك أي أعراض؟ يُفضّل اختبار PCR، ولكن لا بأس بالاختبار المنزلي السريع. انتظر لمدة 5 أيام بعد التعرّض قبل الاختبار.



هل تنوي السفر بالطائرة؟

يعتمد التوقيت ونوع الاختبار على متطلبات شركة الطيران، ولكن عادةً ما يُفضّل إجراء اختبارات PCR قبل السفر بمدة لا تزيد عن 3 أيام.



هل ذهبت إلى حدثٍ مزدحم/داخلي أو تعرّضت لموقفٍ آخر عالي المخاطر؟

قم بإجراء اختبار منزلي سريع أو اختبار PCR بعد 5 أيام من الحدث.



هل تُعاني من أعراض COVID-19 وأنت مُخالط وثيق؟

يُعد اختبار PCR هو الأفضل، ولكن الاختبار المنزلي السريع لا بأس به، قم بأي منهما بمجرد بدء الأعراض.



هل لديك أعراض COVID-19 ولكنك لست مُخالطًا وثيقًا؟

يُعد اختبار PCR هو الأفضل، ولكن الاختبار المنزلي السريع لا بأس به، قم بأي منهما بمجرد بدء الأعراض.



فهم نتائج الاختبار:

- تعني النتيجة **الإيجابية للاختبار المنزلي السريع أو اختبار PCR** أنك مُصاب بالفيروس. اتبع إرشادات إدارة الصحة في الإسكندرية (ADH) حول ما يجب عليك فعله إذا كنت مريضًا وابتعد عن الآخرين. انتقل إلى alexandriava.gov/COVIDNextSteps لمعرفة ما يجب فعله بالضبط بعد أن تكون نتيجة اختبارك إيجابية.
- تعني النتيجة **السلبية للاختبار المنزلي السريع** أن الاختبار لم يكتشف الفيروس وقد لا تكون مُصابًا بعدوى، ولكن ذلك لا يستبعد الإصابة تمامًا. يجب أن تخضع لاختبارٍ آخر بعد 24 ساعة على الأقل لاستبعاد الإصابة بعدوى COVID-19 تمامًا.
- إذا كانت نتيجة اختبارك المنزلي السريع سلبية وتُبعتُ باختبارٍ إيجابي من أي نوع، فقد يكون اختبارك الأول غير صحيح أو تم إجراؤه في وقتٍ مبكر جدًا بعد التعرّض، ويجب أن تفترض أن نتيجة اختبارك إيجابية.



اختبار منزلي سريع إيجابي؟ يمكننا مساعدتك!

املاً نموذجًا قصيرًا حتى تتمكن إدارة الصحة بالإسكندرية من تزويدك بمزيد من المعلومات والموارد للبقاء في المنزل بأمان: redcap.link/aiv7nppx

